

Hernia discal lumbar. Una visión terapéutica desde nuestra experiencia. Anexos



Fig. 1. Foraminectomía simple



Fig. 2. Hernia de disco L4-L5.

Tabla 1. Relación entre grupo de edad y sexo.

Sexo Grupo de edad (años)	Masculino		Femenino		Total	
	No	%	No	%	No	%
Menos de 20	2	4,76	-	-	2	2,98
21 a 30	4	9,52	1	4,0	5	7,46
31 a 40	15	35,72	13	52,0	28	41,79
41 a 50	13	30,95	9	36,0	22	32,84
51 y más	8	19,05	2	8,0	10	14,93
Total	42	62,69	25	37,31	67	100,0
Edad media	44,2		36,4		42,3	

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Nota: % sobre el total de cada sexo.

TABLA 2. Cambio en el nivel de discapacidad antes y después de la cirugía (ODI).

Nivel de discapacidad preoperatorio	Nivel de discapacidad a los cuatro años						Total	
	mínima		moderada		severa		No	%
	No	%	No	%	No	%		
moderada	10	14,92	-	-	-	-	10	14,92
severa	29	43,29	2	2,98	-	-	31	46,27
inválido	13	19,41	6	8,95	1	1,49	20	29,85
encamado	2	2,98	3	4,49	1	1,49	6	8,96
total	54	80,60	11	16,42	2	2,98	67	100,0

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Nota: % sobre el total de la serie.

Tabla 3. Significación evolutiva del dolor antes y después de la cirugía.

Escala de dolor antes	Escala dolor a los cuatro años					Total antes	
	1	2	3	4	5	No	%
6	2	1	1	-	-	4	5,96
7	5	2	-	-	-	7	10,47
8	8	-	2	-	-	10	14,92
9	22	1	-	1	-	24	35,82
10	17	2	1	1	1	22	32,83
Total	54	6	4	2	1	67	100,0
% total columna	80,6	8,96	5,97	2,98	1,49	67	100,0

Fuente: Planilla de recogida de datos.

Nota: % sobre el total de la serie.