

Efectividad del Índice de Rockall para evaluar riesgo de resangrado en la hemorragia digestiva alta

Anexos

Tabla 1. Pacientes con hemorragia digestiva alta según edad y sexo. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011 – 2013.

Edad (años)	Femenino		Masculino		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
20-29	0	0,0	5	5,6	5	3,6
30-39	1	2,0	4	4,4	5	3,6
40-49	3	6,0	16	17,7	19	13,6
50-59	9	18,0	15	16,7	24	17,1
Sub-total <60	13	26,0	40	44,4	53	37,9
60-79	20	40,0	36	40,0	56	40,0
≥80	17	34,0	14	15,6	31	22,1
Total	50	100,0	90	100,0	140	100,0
Edad mínima	38		20		20	
Edad máxima	98		93		98	
$\bar{X} \pm DE$	71,9 $\pm$ 14,7		60,6 $\pm$ 17,6		64,6 $\pm$ 17,4	

t de Student = 3,8 GL= 138 IC95%=[4,8;16,4] (significativo)

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 2. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta según comorbilidad de los mismos. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011 – 2013

Comorbilidad	Frecuencias	Porcentaje
Hepatopatías	12	8,57
Gastropatías	13	9,29
Neoplasias	5	3,57
Otras	78	55,71
Ninguna	32	22,86
Total	140	100

Fuente: Base automatizada de datos.

Tabla 3. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta según factores de riesgo. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011 – 2013.

Factores de Riesgo	Sexo		Total	Porcentaje
	Femenino	Masculino		
Alcohol	0	10	10	7,14
AINES	27	36	63	45
Tabaco	4	11	15	10,72
No refiere	19	33	52	37,14

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 4. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según forma de presentación. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013

Tipo de hemorragia	Frecuencia	Porcentaje
Melena	108	77,14
Hematemesis	13	9,29
Ambas	19	13,57
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 5. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según estabilidad hemodinámica. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013

Estabilidad hemodinámica	Frecuencia	Porcentaje
Shock Hipovolémico	20	14,29
Sin shock	109	77,86
H.T.A	11	7,85
Total	140	100

Fuente: Base automatizada de datos.

Tabla 6. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según antecedentes previos y su relación con la recidiva de la H.D.A. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013.

Antecedentes previos de HDA	Frecuencia	Porcentaje
Si	27	19,29
No	113	80,71
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 6.1

Recidiva en los últimos 5 años	Frecuencia	Porcentaje
1	7	25,93
2 – 4	20	74,07
Más de 5	0	0
Total	27	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 7. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según diagnóstico endoscópico. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013.

Endoscopia	Frecuencia	Porcentaje
Si	78	55,71
No	62	44,29
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 8. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según estratificación de riesgo de mortalidad y recidiva de Rockall. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013.

Score de Rockall	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	31	22,14
Moderado	56	40,0
Alto	53	37,86
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 9. Resultados obtenidos por cada valor del Score Rockall en pacientes con hemorragia digestiva alta. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”

Score Rockall	No. de pacientes		Resangrado		Mortalidad		Transfusiones	
	No	%	No	%	No	%	No	%
0	4	2,86	0	0	0	0	0	0
1	9	6,43	1	11,11	0	0	0	0
2	18	12,86	1	5,56	1	5,56	4	22,22
3	25	17,86	2	8,0	0	0	5	20,0
4	31	22,14	5	16,13	0	0	7	22,58
5	19	13,57	4	21,05	3	15,79	5	26,32
6	11	7,86	3	27,27	1	9,09	4	36,36
7	13	9,28	3	23,08	1	7,69	3	23,08
8	4	2,86	3	75	2	50	3	75
9	6	4,28	4	66,67	2	33,33	5	83,33
Total	140	100	26	18,57	10	7,14	36	25,71

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 10. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según estadía hospitalaria. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013.

Estadía	Frecuencia	Porcentaje
1 – 7 días	131	93,57
8 – 14 días	6	4,29
Más 15 días	3	2,14
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 11. Pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, según estado al egreso. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”. 2011-2013.

Condición al alta	Frecuencia	Porcentaje
Vivos	130	92,86
Fallecidos	10	7,14
Total	140	100

Fuente: Base de datos automatizada.

Tabla 12. Pacientes fallecidos distribuidos considerando el punto de score 5 para discriminar riesgo de mortalidad según el Score de Rockall. Hospital General Universitario “Abel Santamaría Cuadrado”

Fallecidos	Score Rockall ≥ 5		Score Rockall < 5		Total
	No.	%	No.	%	
Si	8	80	2	20	10
No	45	34,62	85	65,38	130
Total	53	37,86	87	62,14	140

Fuente: Base de datos automatizada.